

レジメン名： XELOX+BV

対象疾患名： 大腸癌

<投与スケジュール> 1クール： 21日間

投与期間： ー

| 投与順 | 薬剤   | 投与方法 | 時間                          | Day1 |
|-----|--|------|-----------------------------|------|
| Rp1 | デキサート9.9mg<br>アロキシバッグ0.75mg                | 点滴静注 | 15分                         | ●    |
| Rp2 | アバスチン7.5mg/kg<br>生食100mL                   | 点滴静注 | 初回90分<br>2回目60分<br>3回目以降30分 | ●    |
| Rp3 | エルプラット130mg/m <sup>2</sup><br>5%ブドウ糖液250mL | 点滴静注 | 120分                        | ●    |
| Rp4 | 生食50mL                                     | 点滴静注 | 全開                          | ●    |

※カペシタビン 2000mg/m<sup>2</sup>/日 Day1～Day14（分2）内服、7日間休薬

| 体表面積  | 投与量      |
|---|----------|
| 1.36m <sup>2</sup> 未満                       | 2400mg/日 |
| 1.36m <sup>2</sup> 以上～1.66m <sup>2</sup> 未満 | 3000mg/日 |
| 1.66m <sup>2</sup> 以上～1.96m <sup>2</sup> 未満 | 3600mg/日 |
| 1.96m <sup>2</sup> 以上                       | 4200mg/日 |