

レジメン名： CDDP+PEM+キイトルーダ

対象疾患名： 非小細胞肺癌

<投与スケジュール> 1クール： 21日間

投与期間： 4クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
Rp1	生食50mL	点滴静注	全開	●				
Rp2	キイトルーダ200mg 生食100mL	点滴静注	30分	●				
Rp3	デキサート9.9mg アロキシバッグ0.75mg	点滴静注	15分	●				
Rp4	アリムタ500mg/m ² 生食100mL	点滴静注	10分	●				
Rp5	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液8mL	点滴静注	60分	●				
Rp6	マンニトールS 200mL	点滴静注	30分	●				
Rp7	ランダ75mg/m ² 生食300mL	点滴静注	60分	●				
Rp8	ソルデム3A 500mL	点滴静注	60分	●				
Rp9	生食500mL	点滴静注	60分	●				
Rp10	デキサート3.3mg ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分		●	●		
Rp11	生食500mL	点滴静注	60分		●	●		
Rp12	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分				●	●
Rp13	生食500mL	点滴静注	60分				●	●

※イメンドカプセル Day1：125mg、Day2～3：80mg

※パンビタン末1g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで連日内服

※メコバラミン注1000μg アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで3クール（9週）毎に投与