

レジメン名： IFM+DXR

対象疾患名： 縦隔肉腫

<投与スケジュール> 1クール： 21日間

投与期間： 1クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
Rp1	ソルデム3A 2500mL メイロン8.4% 100mL	点滴静注 メイン	24時間	●	●	●	●	●
Rp2	デキサート6.6mg アロキシバグ0.75mg	点滴静注 サイド	15分	●				
Rp3	デキサート6.6mg 生食100mL	点滴静注 サイド	30分		●	●	●	●
Rp4	イホマイド2g/m ² 生食500mL	点滴静注 サイド	4時間	●	●	●	●	●
Rp5	ウロミテキサン400mg/m ² 生食50mL	点滴静注 サイド	30分 イホマイド投 与時	●	●	●	●	●
Rp6	ウロミテキサン400mg/m ² 生食50mL	点滴静注 サイド	30分 イホマイド開 始4時間後	●	●	●	●	●
Rp7	ドキシソルビシン30mg/m ² 生食250mL	点滴静注 サイド	2時間	●	●			
Rp8	生食50mL	点滴静注 サイド	全開	●	●			
Rp9	ウロミテキサン400mg/m ² 生食50mL	点滴静注 サイド	30分 イホマイド開 始8時間後	●	●	●	●	●