

レジメン名： FOLFIRI+Cet（初回）

対象疾患名： 大腸癌

<投与スケジュール> 1クール： 14日間

投与期間： 1クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day8
Rp1	ポララミン5mg デキサート9.9mg アロキシバッグ0.75mg	中心静注	30分	●			
Rp2	アービタックス400mg/m ² 生食500mL	中心静注	120分	●			
Rp3	生食100mL	中心静注	60分	●			
Rp4	レボホリナート200mg/m ² 5%ブドウ糖液250mL	中心静注	120分 カンプトと同 時投与	●			
Rp5	カンプト150mg/m ² 5%ブドウ糖液250mL	中心静注	90分 レボホリナート と同時投与	●			
Rp6	5-FU400mg/m ² 生食50mL	中心静注	全開	●			
Rp7	5-FU2400mg/m ² 生食500mL	中心静注	46時間	●			
Rp8	生食50mL	中心静注	全開			●	
Rp9	ポララミン5mg デキサート6.6mg 生食100mL	中心静注	30分				●
Rp10	アービタックス250mg/m ² 生食250mL	中心静注	60分				●
Rp11	生食50mL	中心静注	全開				●

※イメンドカプセル Day1：125mg、Day2～3：80mg