

レジメン名：CBDCA+PEM+イミフィンジ+イジユド（導入療法）**対象疾患名：非小細胞肺癌**

<投与スケジュール> 1クール 21 日間 投与期間 4クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	day 1
Rp1.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●
Rp2.	イジユド [®] 75mg/body 生理食塩液 100mL	点滴静注	60分	●
Rp3.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●
Rp4.	イミフィンジ 1500mg/body 生理食塩液 250mL	点滴静注	60分	●
Rp5.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●
Rp6.	デキサート12mg アロカリス235mg アロキシバッグ0.75mg	点滴静注	30分	●
Rp7.	アリムタ 500mg/m ² 生理食塩液 100mL	点滴静注	10分	●
Rp8.	カルボプラチン（AUC：6） 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	60分	●
Rp9.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●

※パンビタン末1g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで連日内服

※メコバラミン注1000 μ g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで3クール（9週）毎に投与