

レジメン名：CDDP+PEM+イミフィンジ+イジユド（導入療法）

対象疾患名：非小細胞肺癌

<投与スケジュール> 1クール 21 日間 投与期間 4クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	day 1	day2	day3	day4	day5
Rp1.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●				
Rp2.	イジユド 75mg/body 生理食塩液 100mL	点滴静注	60分	●				
Rp3.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●				
Rp4.	イミフィンジ 1500mg/body 生理食塩液 250mL	点滴静注	60分	●				
Rp5.	生理食塩液 50mL	点滴静注	5分	●				
Rp6.	デキサート12mg アロカリス235mg アロキシバッグ0.75mg	点滴静注	30分	●				
Rp7.	アリムタ 500mg/m ² 生理食塩液 100mL	点滴静注	10分	●				
Rp8.	ソルデム3A 500mL 硫酸マグネシウム補正液 8mL	点滴静注	60分	●				
Rp9.	マンニトールS 200mL	点滴静注	30分	●				
Rp10.	ランダ 75mg/m ² 生理食塩液 300mL	点滴静注	90分	●				
Rp11.	ソルデム3A 500mL	点滴静注	60分	●				

Rp12.	生理食塩液 500mL	点滴静注	60分	●				
Rp13.	ソルデム3A 500mL デキサート4mg	点滴静注	90分		●	●	●	●
Rp14.	生理食塩液 500mL	点滴静注	90分		●	●	●	●

※パンビタン末1g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで連日内服

※メコバラミン注1000 μ g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで3クール（9週）毎に投与