

レジメン名： CDDP+PEM+BV

対象疾患名： 非小細胞肺癌

<投与スケジュール> 1クール： 21日間

投与期間： 6クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
Rp1	デキサート9.9mg アロキシバッグ0.75mg アロカリス点滴静注235mg	点滴静注	30分	●				
Rp2	アリムタ500mg/m <sup>2</sup> 生食100mL	点滴静注	10分	●				
Rp3	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液8mL	点滴静注	60分	●				
Rp4	マンニトールS 200mL	点滴静注	30分	●				
Rp5	ランダ75mg/m <sup>2</sup> 生食300mL	点滴静注	90分	●				
Rp6	アバスチン15mg/kg 生食100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	●				
Rp7	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分	●				
Rp8	生食500mL	点滴静注	90分	●				
Rp9	デキサート3.3mg ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分		●	●		
Rp10	生食500mL	点滴静注	90分		●	●		
Rp11	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分				●	●
Rp12	生食500mL	点滴静注	90分				●	●

※パンビタン末1g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで連日内服

※メコバラミン注1000μg アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで3クール（9週）毎に投与