

レジメン名： CDDP+PEM+キイトルーダ

対象疾患名： 非小細胞肺癌

<投与スケジュール> 1クール： 21日間

投与期間： 4クール

| 投与順 | 薬剤 | 投与方法 | 時間 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
|------|---|------|-----|------|------|------|------|------|
| Rp1 | 生食50mL | 点滴静注 | 全開 | ● | | | | |
| Rp2 | キイトルーダ200mg 生食100mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | |
| Rp3 | デキサート9.9mg アロキシバッグ0.75mg アロカリス点滴静注235mg | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | |
| Rp4 | アリムタ500mg/m ² 生食100mL | 点滴静注 | 10分 | ● | | | | |
| Rp5 | ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液8mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | |
| Rp6 | マンニトールS 200mL | 点滴静注 | 30分 | ● | | | | |
| Rp7 | ランダ75mg/m ² 生食300mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | |
| Rp8 | ソルデム3A 500mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | |
| Rp9 | 生食500mL | 点滴静注 | 60分 | ● | | | | |
| Rp10 | デキサート3.3mg ソルデム3A 500mL | 点滴静注 | 90分 | | ● | ● | | |
| Rp11 | 生食500mL | 点滴静注 | 60分 | | ● | ● | | |
| Rp12 | ソルデム3A 500mL | 点滴静注 | 90分 | | | | ● | ● |
| Rp13 | 生食500mL | 点滴静注 | 60分 | | | | ● | ● |

※パンビタン末1g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで連日内服

※メコバラミン注1000μg アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで3クール（9週）毎に投与