

レジメン名： オブジーボ+ヤーボイ+CDDP+PEM

対象疾患名： 非小細胞肺癌

<投与スケジュール> 1クール： 42日間

投与期間： 1クール

投与順	薬剤	投与方法	時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26
Rp1	生食50mL	点滴静注	全開	●					●				
Rp2	オブジーボ360mg 生食100mL	点滴静注	30分	●					●				
Rp3	生食100mL	点滴静注	30分	●									
Rp4	ヤーボイ1mg/kg 生食50mL	点滴静注	30分	●									
Rp5	デキサート9.9mg アロキシバグ0.75mg アロカリス点滴静注235mg	点滴静注	30分	●					●				
Rp6	アリムタ500mg/m <sup>2</sup> 生食100mL	点滴静注	10分	●					●				
Rp7	ソルデム3A 500mL 硫酸Mg補正液8mL	点滴静注	60分	●					●				
Rp8	マンニトールS 200mL	点滴静注	30分	●					●				
Rp9	ランダ75mg/m <sup>2</sup> 生食300mL	点滴静注	90分	●					●				
Rp10	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分	●					●				
Rp11	生食500mL	点滴静注	90分	●					●				
Rp12	デキサート3.3mg ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分		●	●				●	●		
Rp13	生食500mL	点滴静注	90分		●	●				●	●		
Rp14	ソルデム3A 500mL	点滴静注	90分				●	●				●	●
Rp15	生食500mL	点滴静注	90分				●	●				●	●

※パンビタン末1g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで連日内服

※メコバラミン注1000 $\mu$ g アリムタ初回投与7日以上前～アリムタ最終投与日から22日目まで3クール（9週）毎に投与